

Le tableau ci-dessous indique les espèces pour lesquelles la prise d'une photo est requise (par département). La dernière colonne vous renseigne sur la partie du corps à prendre en photo pour faciliter une éventuelle validation ultérieure.

Condition de validation d'une donnée	
-	Aucune photo nécessaire pour validation
X	Photo préférable pour validation
X	Photo recommandée pour validation
X	Invalide sans photo

Calopterigidae	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Angle de photo recommandée
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i> (Vander Linden, 1825)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté
<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	-	-	X	X	X	Vue générale de côté
<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté
<i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté
Lestidae						
<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté
<i>Lestes barbarus</i> (Fabricius, 1798)	-	-	-	-	-	Pièces génitales (♂ : de dessus ; ♀ : de côté)
<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	X	-	-	X	X	Pièces génitales (♂ : de dessus ; ♀ : de côté)
<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	X	-	-	X	X	Pièces génitales (♂ : de dessus ; ♀ : de côté)
<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	X	-	-	X	-	Pièces génitales (♂ : de dessus ; ♀ : de côté)
<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté
Platycnemididae						
<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	-	-	X	-	-	Vue générale de côté et du dessus
Coenagrionidae						
<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Angle de photo recommandée
<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	X	-	-	X	X	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : de côté
<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	X	X	X	X	X	Vue générale de dessus
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	X	-	X	X	X	Vue générale de dessus
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	-	-	-	-	-	Pièces génitales ♂ : de l'arrière + Pronotum
<i>Ischnura graellsii</i> (Rambur, 1842)	X	X	X	X	X	Pièces génitales ♂ : de l'arrière + Pronotum
<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	X	-	X	X	X	Vue générale de dessus
<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
Aeshnidae						
<i>Aeshna affinis</i> Vander Linden, 1820	X	-	-	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Aeshna cyanea</i> (O. F. Müller, 1764)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Aeshna isoceles</i> (O. F. Müller, 1767)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Aeshna juncea</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X (X hors montagne)	Vue générale de côté et du dessus
<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	X	-	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	X	-	-	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Brachytron pratense</i> (O. F. Müller, 1764)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
Gomphidae						
<i>Stylurus flavipes</i> (Charpentier, 1825)	X	X	X (X hors Adour et affluents)	X	X (X hors Adour et affluents)	Vue générale de côté et du dessus
<i>Gomphus graslinii</i> Rambur, 1842	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Gomphus simillimus</i> Selys, 1840	-	-	-	X	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Gomphus vulgatissimus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Angle de photo recommandée
<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840)	-	-	-	X	-	Vue générale de côté et du dessus
Cordulegastridae						
<i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843	X	X	X	X	X (X hors montagne)	Vue générale de côté et du dessus
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
Macromidae						
<i>Macromia splendens</i> (Pictet, 1843)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
Cordulidae						
<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	Vue de face , de côté et du dessus
<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	X	-	-	X	X	Vue générale de côté
<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	X	X	X	X	X	Vue de face , de côté et du dessus
Libellulidae						
<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Burmeister, 1839)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus
<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus
<i>Leucorrhinia pectoralis</i> (Charpentier, 1825)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus
<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	-	-	-	-	-	Vue générale du dessus
<i>Libellula fulva</i> O. F. Müller, 1764	-	-	-	X	-	Vue générale du dessus
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	-	-	-	-	-	Vue générale du dessus
<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	-	-	-	-	-	Vue générale du dessus
<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus (avec ailes bien nettes)
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	-	-	-	-	-	Vue générale du dessus
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	-	-	-	-	-	Vue générale du dessus (avec ailes bien nettes)
<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale du dessus / ♀ : Pièces génitales de côté
<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale du dessus / ♀ : Pièces génitales de dessous
<i>Sympetrum flaveolum</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X (X hors montagne)	Vue générale du dessus
<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	-	-	-	-	-	Vue générale de côté et du dessus
<i>Sympetrum meridionale</i> (Selys, 1841)	X	-	-	-	X	Vue générale de côté et du dessus

	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Angle de photo recommandée
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O. F. Müller, 1764)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale du dessus / ♀ : Pièces génitales de dessous
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	-	-	-	-	-	♂ : Vue générale de côté / ♀ : Pièces génitales de dessous
<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale de côté / ♀ : Pièces génitales de dessous
<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	X	-	-	-	-	Vue générale du dessus
<i>Trithemis kirbyi</i> (Selys, 1891)	X	X	X	X	X	Vue générale du dessus
Espèces potentiellement présentes	Les données des espèces ci-dessous ne pourront être validées sans présentation d'une photo/exuvie.					
<i>Lestes macrostigma</i> (Eversmann, 1836)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Coenagrion caeruleum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	X	X	X	X	X	♂ : Vue générale de dessus / ♀ : Pronotum
<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus
<i>Leucorrhinia dubia</i> (Vander Linden, 1825)	X	X	X	X	X	Vue générale de côté et du dessus